

Médicament STREPSILS LIDOCAÏNE

Dans quel cas le médicament STREPSILS LIDOCAÏNE est-il prescrit ?

Ce médicament contient un anesthésique local (lidocaïne) qui a un effet antalgique et des substances antiseptiques qui ont une action antibactérienne.

Il est utilisé dans le traitement d'appoint des affections de la gorge et de la bouche (maux de gorge peu intenses et sans fièvre, aphtes...).

Présentations du médicament STREPSILS LIDOCAÏNE

STREPSILS LIDOCAÏNE : pastille à sucer (verte) ; boîte de 24

Composition du médicament STREPSILS LIDOCAÏNE

	p past
Lidocaïne chlorhydrate	2 mg
Amylmétacrésol	0,6 mg
Alcool dichlorobenzyle	1,2 mg
Lévomenthol	+
Sucre	2,5 g

Substances actives : Alcool dichlorobenzyle, Amylmétacrésol, Lidocaïne chlorhydrate

Excipients : Acide tartrique, Badiane essence, Glucose liquide, Indigotine, Jaune de quinoléine, Lévomenthol, Menthe poivrée essence, Saccharine sodique, Saccharose solution, Sucre

Contre-indications du médicament STREPSILS LIDOCAÏNE

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux anesthésiques locaux.

Attention En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, de douleur en avalant ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin. Il pourra faire la différence entre une pharyngite et une angine. En cas d'angine bactérienne, un traitement antibiotique est nécessaire afin d'éviter des complications ultérieures, cardiaques ou rénales.

L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux (gargarisme, collutoire, pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la gorge.

Une surconsommation pourrait entraîner le passage de l'anesthésique local dans le sang et provoquer des troubles nerveux et cardiaques : respectez la posologie.

Ces pastilles contiennent du sucre en quantité notable.

Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Interactions du médicament STREPSILS LIDOCAÏNE avec d'autres substances

Il est généralement inutile d'associer des antiseptiques différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles en automédication : pastille, collutoire et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Allaitement :

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament STREPSILS LIDOCAÏNE

Les pastilles doivent être sucées lentement sans être croquées, à distance des repas.

Les prises doivent être espacées d'au moins 2 heures.

Posologie usuelle :

- Adulte : 1 pastille, 1 à 8 fois par jour.
- Enfant de 6 à 15 ans : 1 à 4 pastilles par jour.
-

Conseils

Ce médicament peut être en accès libre dans certaines pharmacies ; néanmoins, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

Évitez l'usage de ce médicament avant les repas : l'anesthésique local est susceptible de provoquer des troubles de la déglutition ; ceux-ci pourraient être à l'origine du passage d'aliments dans les voies respiratoires.

Effets indésirables possibles du médicament STREPSILS LIDOCAÏNE

Réaction allergique.

Engourdissement passager de la langue.

Laboratoire Reckitt Benckiser Healthcare France

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.



Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10

pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.